

Sacalia quadriocellata

DISTRIBUZIONE

Nelle province cinesi di Guangdong (ovest) e di Guangxi (est), nell'isola di Hainan, centro Vietnam e Laos.

HABITAT

Corsi acquatici lenti, piccoli laghi, raccolte d' acqua con vegetazione acquatica e fondali fangosi poco profondi.

DIMENSIONI MASSIME

Piccole; difficilmente superano i 15 cm di lunghezza.

CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI

Poco propensa al nuoto, preferisce sostare in acque poco profonde. Di indole timida e tranquilla sia con i conspecifici che con specie differenti.

MANTENIMENTO IN CATTIVITA'

L'allevamento all'aperto è consigliato solo nel periodo estivo in un laghetto profondo almeno 1 metro con circa 30 cm di fondo fangoso o sabbioso con argini non troppo ripidi, tronchi che emergono dall' acqua, molte radici, appigli e un' ampia zona di battigia molto bassa. Piante acquatiche per ricreare un ambiente ottimale. Deve essere costruito in una zona soleggiata ma con zone d' ombra. Per evitare eventuali fughe è bene che sia recintato per almeno 50 cm o più in altezza e ulteriori 30 cm sotto terra.

In acquaterrario con acqua alta quanto la lunghezza dell' animale, con appigli o delle zone di sosta meno profonde. Temperature dell' acqua tra i 23 e i 25°C. Area emersa costituita da sassi non taglienti o tronchi e una superficie estesa pari almeno al 30% della superficie acquatica, dotata di un neon UVB posto a massimo 30 cm senza nulla interposto.

ALIMENTAZIONE

E' una specie carnivora. Può essere somministrato pesce d' acqua dolce (alborelle, acquadelle, trota ecc..), insetti (grilli, cavallette, camole della farina...), girini e piccoli invertebrati: i cibi più graditi e adatti a questa specie sono lombrichi e piccole chioccioline con guscio. Solo raramente si cibano di piante acquatiche galleggianti. Si consiglia di somministrare con parsimonia carni bianche e rosse. Ogni tanto possono essere somministrati cibi in pellet di ottima marca ma senza abusarne. E' buona norma lasciare sempre a disposizione un osso di seppia per fornire il calcio necessario. E' necessario che la dieta sia estremamente varia per non incorrere a carenze di qualsiasi tipo.

RIPRODUZIONE

Depone dalle 2 alle 6 uova durante tutta stagione.

LETARGO

No. Nei luoghi di origine le temperature si abbassano lievemente per un breve periodo. In cattività è consigliata una latenza invernale di 2 mesi a 15°C

STATUS GIURIDICO

Sacalia quadriocellata non è in nessuna legge o decreto ministeriale. Non è considerata specie a rischio.

