

Siebenrockiella crassicollis

DISTRIBUZIONE

Dal Vietnam meridionale ad ovest attraverso la Thailandia sino alla regione del Tenasserim nel Myanmar e a sud attraverso la Penisola Malese sino a Sumatra, Giava e al Borneo.

HABITAT

Vive in corsi d'acqua a corrente lenta, fondo melmoso e con abbondante vegetazione (stagni, paludi, acquitrini, laghi e fiumi).

DIMENSIONI MASSIME

Specie di taglia medio-piccola, non supera infatti i 20 cm.. I maschi presentano il piastrone leggermente concavo oltre alla coda più lunga e grossa rispetto a quella delle femmine, e da adulti perdono, a differenza delle femmine, i punti bianchi che fin dalla nascita ne caratterizzano il capo.

CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI

E' specie dal comportamento schivo, se ne sta generalmente rintanata tra la vegetazione più fitta immergendosi con una certa frequenza alla ricerca di cibo. Da tenere in considerazione il fatto che questi animali vanno maneggiati con una certa cautela, se disturbati infatti emettono dalla cloaca un secreto dal lezzo insopportabile.

MANTENIMENTO IN CATTIVITA'

Specie di non difficile allevamento, dato il carattere docile, si possono alloggiare anche più animali nello stesso contenitore. Si può tenere all'aperto durante la buona stagione (da Maggio a Settembre) tenendo conto che non sopporta a lungo temperature al di sotto dei 15-16°C. All'interno vanno alloggiate in vasche di circa 100X40 con una parte emersa riscaldata da lampade ma senza illuminazione diretta. La temperatura dell'acqua va mantenuta (consiglio valido per la stragrande maggioranza della tartarughe acquatiche) attorno ai 25-27°C. Lampade ad emissione di raggi UVB/UVA non sono strettamente necessarie. Essendo abituale frequentatore dei fondali alla perenne ricerca del cibo, sarà opportuno tenerne il debito conto nell'approntare le vasche, il cui fondo sarà coperto da uno strato di sabbia di fiume lavata.

ALIMENTAZIONE

In natura questa specie si nutre di invertebrati acquatici (chioccioline e altri molluschi), mostrando anche tendenze saprofaghe alimentandosi di materiale vegetale in decomposizione e di carogne. In cattività si può alimentare con pellet commerciali, lombrichi e pezzetti di pesce. A volte sbocconcella foglie di lattuga, cicoria, giacinti d'acqua e qualche pezzetto di frutta a polpa morbida.

RIPRODUZIONE

In natura può arrivare a deporre anche 4 volte, da Aprile a Giugno, 1 o 2 uova. In cattività generalmente depone un solo uovo (piuttosto allungato, misura mm. 52x28) durante tutto l'anno, anche in relazione alle condizioni climatiche, ma con maggior frequenza tra Maggio e Luglio. L'incubazione a 29-30°C dura 68-84 giorni, ma può arrivare a oltre 110 giorni a 25°C..

LETARGO

Assolutamente da evitare.

STATUS GIURIDICO

Attualmente di libera vendita.

