

# *Cistoclemmys flavomarginata*

## **DISTRIBUZIONE**

Cina meridionale, Taiwan.

## **HABITAT**

Vive nei pressi di raccolte d'acqua poco profonde, come risaie, stagni e piccoli ruscelli.

## **DIMENSIONI MASSIME**

Medio-piccole; 18 cm di carapace.

## **CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI(abitudini)**

Specie semiacquatica con attività diurna, scarsa nel nuoto, trascorre gran parte del suo tempo sulla terraferma, dove preferisce procurarsi il cibo e mangiare. Gli esemplari molto giovani tendono ad essere più acquatici. Apprezza esporsi al sole per riscaldarsi. In caso di pericolo o se disturbata si ritira all'interno del carapace chiudendo il piastrone per mezzo di scuti flessibili.

## **MANTENIMENTO IN CATTIVITA'**

Questa tartaruga può essere allevata all'aperto tutto l'anno. E' necessario un laghetto poco profondo, con argini non ripidi, esposto in un punto che garantisca zone d'ombra. Deve essere presente una parte terrestre, ampia, fornita di vegetazione e ripari. Per evitare eventuali fughe è bene che lo spazio dedicato all'allevamento sia recintato anche in profondità. Per l'allevamento in terracquario occorre che esso sia abbastanza grande, con una parte terrestre ampia, dotata di vegetazione, utile a procurare nascondigli, zone d'ombra e a mantenere una buona umidità. La zona acquatica deve essere profonda pochi centimetri. L'ambiente va riscaldato ad una temperatura tra 22 e 29°C. E' inoltre utile fornire una lampada che produca raggi uva-b.

## **ALIMENTAZIONE**

Specie onnivora. Può essere somministrato: vegetali, frutta, pesce, insetti e molluschi, sono apprezzati lombrichi e lumache. Occasionalmente cibi in pellet. E' buona norma lasciare a disposizione un osso di seppia per fornire il calcio necessario. E' necessario che la dieta sia estremamente varia per non incorrere in carenze di qualsiasi tipo.

## **RIPRODUZIONE**

Depongono da 1 a 3 uova più volte l'anno. Schiudono dopo 70-100 giorni a temperature di 28-30°C.

## **LETARGO**

Si, questa specie può trascorrere un periodo di letargo infossata nel terreno e tra il fogliame. E' bene monitorare nel tempo la situazione, in particolare nel caso di freddo intenso. Sconsigliato ai giovani esemplari e a quelli debilitati o in via di guarigione.

## **STATUS GIURIDICO**

E' inserita in CITES appendice II, allegato B.

