

Kinosternon baurii

DISTRIBUZIONE

Florida e costa della Virginia.

HABITAT

Piccoli corsi d'acqua, stagni, ruscelli, paludi, canali, con acque tranquille, fondale fangoso e vegetazione acquatica.

DIMENSIONI MASSIME

Piccole; 12-13 cm di carapace.

CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI(abitudini)

Tartaruga prettamente acquatica, poco propensa al nuoto, preferisce camminare sui fondali e sostare in acque poco profonde. Spende parte del suo tempo sulla terra ferma, specialmente in seguito alle piogge. E' particolarmente attiva nelle prime ore del mattino e al crepuscolo. Poco si espone per riscaldarsi al sole. Durante il periodo caldo e in caso di prosciugamento degli ambienti acquatici questa tartaruga può estivare. E' una specie mordace.

MANTENIMENTO IN CATTIVITA'

Questa specie si adatta bene ai nostri climi e se correttamente stabulata è possibile allevarla all'aperto tutto l'anno. E' necessario un laghetto abbastanza grande, con argini non ripidi, tronchi emergenti, appigli, piante acquatiche e un'ampia zona di battigia con fogliame, dove l'animale può infossarsi per trascorrere il letargo fuori dall'acqua. Per evitare eventuali fughe è bene recintare il laghetto anche in profondità. Per l'allevamento in acquaterrario è necessario che esso sia poco profondo, fornito di una discreta area emersa, appigli, piante acquatiche, lampada uva-b e un filtro che mantenga una buona qualità dell'acqua. Le temperature dell'acqua devono essere comprese tra i 21 e 25°C.

ALIMENTAZIONE

E' una specie onnivora tendenzialmente carnivora. Può essere somministrato pesce d'acqua dolce (acquadelle, alborelle, trota, ecc.), insetti(grilli, lombrichi, camole della farina, ecc.), molluschi, piccoli crostacei e piante acquatiche. Si consiglia di somministrare con molta parsimonia carni rosse e bianche. Ogni tanto è possibile somministrare cibi in pellet. E' buona norma lasciare sempre a disposizione un osso di seppia per fornire il calcio necessario. La dieta deve essere estremamente varia per non incorre in carenze di qualunque tipo.

RIPRODUZIONE

La maturità sessuale è raggiunta verso i 5-6 anni. Depongono da 1 a 5 uova in più deposizioni l'anno. Le uova schiudono dopo 3-4 mesi circa a temperature tra i 25 e 30°C.

LETARGO

Si, alle nostre temperature, dai primi di novembre a metà marzo. Spesso questa specie trascorre il letargo infossata tra il fogliame e il terreno umido, nei pressi degli ambienti acquatici. Sconsigliato ai giovani esemplari e a quelli debilitati o in via di guarigione.

STATUS GIURIDICO

Non è inserita in CITES, quindi è di libera vendita. Non è considerata specie a rischio.

